

Figuras e táboas



Figura 1. Macho de escribenta das canaveiras (*Emberiza schoeniclus* L.subsp. *lusitanica* Steinbacher) nunha zona húmida galega en maio de 2018. © Emilio Martínez Sabarís/sanxenobiodiversidade.blogspot.com

Táboa 1. Localidades de cría confirmada ou posible de escribenta das canaveiras (*Emberiza schoeniclus* L.subsp. *lusitanica* Steinbacher) en Galiza, segundo a bibliografía citada no texto e tamén:

<https://www.seo.org/boletin/seguimiento/censos/43%20escribano%20palustre/html5forpc.html?page=0>,
https://www.researchgate.net/publication/332606207_Censo_de_Escribenta_das_canaveiras_Emberiza_schoeniclus_lusitanica_en_Galicia_2018, e
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/7_escribano_palustre_2005_tcm30-208006.pdf

		1990 a 2001		2005		2007		2015		2018		2021		Notas
Localidade	Concello(s)	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	
Ría de Ribadeo	Ribadeo	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Lagoa de Cospeito	Cospeito	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Canaval de Pantín	Valdoviño	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Lagoa da Frouseira	Valdoviño	n.c.	n.c.	3	3	3	3	5	6	6	7	9	11	b
Canaval de San Xurxo	Ferrol	n.c.	n.c.	2	5	2	2	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	c
Lagoa de Doniños	Ferrol	n.c.	n.c.	1	1	0	0	n.c.	n.c.	1	1	0	0	d
Canaval de San Xiao	Betanzos	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	a
Zona húmida de Barrañán	Arteixo	n.c.	n.c.	3	3	3	3	1	1	n.c.	n.c.	0	0	e

Complexo húmido de Baldaio	<i>Carballo</i>	n.c.	n.c.	2	2	2	2	0	0	n.c.	n.c.	0	0	c
Esteiro do río Anllóns	<i>Ponteceso/Cabana</i>	n.c.	n.c.	6	6	3	3	n.c.	n.c.	0	0	2	3	f
Lagoa de Traba	<i>Laxe</i>	n.c.	n.c.	3	3	2	3	n.c.	n.c.	3	4	0	0	g
Canaval de Outes	<i>Serra de Outes</i>	6	7	5	5	4	4	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	1	2	h
Esteiro do río Tambre	<i>Noia/Serra de Outes</i>	12	20	10	10	9	9	n.c.	n.c.	2	2	2	4	h
Lagoa de Muro	<i>Porto do Son</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Marisma do Carregal	<i>Ribeira</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Lagoa de Vixán	<i>Ribeira</i>	n.c.	n.c.	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	e
Zona húmida de Coroso	<i>Ribeira</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Canaval de Caiños	<i>A Pobra do Caramiñal</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Esteiro do río Ulla (norte)	<i>Dodro/Valga</i>	40	50	14	16	15	15	3	3	1	2	2	4	h
Esteiro do río Ulla (sur)	<i>Dodro/Valga</i>	7	7	0	0	1	1			0	0			i
Esteiro do río Umia	<i>Cambados</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	j
Canaval do Vao (A Lanzada)	<i>O Grove/Sanxenxo</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	0	0	0	0	j
O Recón	<i>Sanxenxo</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Xunqueira de Alba	<i>Pontevedra</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Salinas de Vilaboa	<i>Vilaboa</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Gándaras de Budiño	<i>O Porriño</i>	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	a
Esteiro do río Miño	<i>A Guarda</i>	13	14	10	10	10	10	1	1	4	4	4	6	k
TOTAL		78	97	61	66	55	56	11	12	17	20	20	30	l

Notas:

a: quizais sen reprodución nas últimas dúas décadas

b: aparente aumento de reprodutores

c: desaparecido como reprodutor quizais antes de 2010 (cambios no hábitat)

d: reprodución case regular na localidade

e: sen datos de reprodución desde 2015, hábitat aínda axeitado

f: poboación aparentemente flutuante, en dous núcleos (Lestimoño e canaval de Ponteceso de Cabana)

g: censo negativo en 2021 quizais por mala cobertura, evidencia de reprodución recente

h: poboación reprodutora en declive desde 2005

i: *censos da ribeira sur do Ulla (Valga) combinados varios anos cos da ribeira norte*

j: *observacións esporádicas de aves na época de cría nos últimos 25 anos*

k: *censo máximo no período 1990-2001 superior a 13; tómase 14 como cifra de referencia*

l: *censos no período 1990-2001 e en 2007 referido a machos cantores; quizais asimilables a parellas*

n.c.: *non censada/censo non dispoñible*